top agrar Leistungen, Mengen, Auflagen und Preise wichtiger Maisherbizide, Teil 1

Mittel	Wirkstoff/-gehalt in g je l/kg	Wirk-klasse	maximale Menge je ha	Einsatz-termin (EC)	Preis €/ha	Hang > 2 %[1]	Abstand Wasser[2]	Abstand Saum[2]	Amarant	Bingelkraut	Franzosenkraut	Kamille	Klettenlabkraut	Flohknöterich	Vogelknöterich	Windenknöterich	Melde/Gänsefuß	Nachts./Stechap.	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Vogelmiere	Ackerwinde	Erdmandelgras	Fuchsschwanz	Borstenhirse	Fadenhirse	Gabelblütige Hirse	Hühnerhirse	Jährige Rispe	Quecke	Verträglichkeit	regenfest in Std.
Überwiegend über den Boden wirkende Präparate																																
Activus SC	400 Pendimethalin	3	4 l	10–13		5	10	5	•	•			•	•	•	•	•	••	••		••			•	•	•	•	•	•		••••	
Adengo	90 Thiencarbazone 225 Isoxaflutole	2 27	0,33 l	VA–13	43	20	*	0	••••	••••	••••	•••	•••	•••	•••	••	•••	••••	•••	•••	••••		••	•	•••	•••	•••	•••	••••		••	
Aspect[3]	200 Flufenacet 333 Terbuthylazin	15 5	1,5 l	11–15		10	*	0	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	•••	•••	•••			••	••	••	••	••	•••		••••	
Dual Gold[4]	960 S-Metolachlor	15	1,25 l	VA–NA		10	*	0												••	•		•		••	••	••	••	•		••••	
Eclaire	600 Aclonifen	32	2,5	VA		10	5*	5	•••	•••	•••	•••	••	•••	••	•	•••		•••	•	•••			••	•	••	•	•	•••		•••	
Gardo Gold[3,4]	188 Terbuthylazin 313 S-Metolachlor	5 15	4 l	VA–NA	38	10	*	0	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	•••	•••	•••		•	••	••	••	••	••	••		••••	
Successor 600[6]	600 Pethoxamid	15	2 l	VA	42	20	*	0	•		••	•		•		•	•	•		••	•		•		•	•	•	•	•		••••	
Spectrum	720 Dimethenamid	15	1,4 l	VA–16			5*	0	•		•	•						•		••	•				••	••	••	••	•		••••	
Spectrum Gold[3]	280 Dimethenamid 250 Terbuthylazin	15 5	2 l	VA–NA	36	20	*	0	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	•••	•••	•••	•••			••	••	••	••	••	••		••••	
Spectrum Plus	213 Dimethenamid 250 Pendimethalin	15 3	4 l	VA–16	92	20	5*	0	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	••	••	•••			••	••	••	••	••	••		••••	
Stomp Aqua	455 Pendimethalin	3	4,4 l	VA–NA	87		5*	5	•	•			•	•	•	•	•	••	••		••			•	•	•	•	•	•		••••	
Successor T[3]	188 Terbuthylazin 300 Pethoxamid	5 15	4 l	11–14	49	20	*	0	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	•••	•••	•••		•	••	•	•	•	••	••		••••	
Überwiegend über die Blätter wirkende Präparate																																
Arigo[5] + Trend	360 Mesotrione 120 Nicosulfuron 30 Rimsulfuron	27 2	330 g 0,33 l	12–18	55	20	*	5	•••	••	•••	•••	••	•••	•	••	••	••••	••	•	•••		•	••	••	•	••	•••	•••	••	•••	3
Arrat + Dash	500 Dicamba 250 Tritosulfuron	4 2	0,2 kg 1,0 l	NA	25		*	0	••	•	••	••	••	•••	••	••	•••	•		•	•••	•••									••	4
Border	100 Mesotrione	27	1 l	12–18	n. i. Pack	20	*	5	•••	••	••••	••	•	•••	•	••	•••	••••	••		••		••			•	•	••			•••	2
Botiga	300 Pyridate 90 Mesotrione	6 27	1 l 2 x 0,5 l	12–18	44		*		•••	••	••••	••	••	•••	••	•••	•••	••••	••		•••		••		•	••	•	••			•••	2
Calaris[3]/ Click Pro[3]	330 Terbuthylazin 70 Mesotrione	5 27	1,5 l	11–18		10	*	0	••••	•••	••••	••••	•••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••	••••		••	•	•	•	•	••	••		•••	1
Callisto	100 Mesotrione	27	1 l	12–18	21		*		•••	••	••••	••	•	•••	•	••	•••	••••	••		••		••			•	•	••			•••	2
Casper + FHS	500 Dicamba 50 Prosulfuron	5 2	0,3 kg 0,3 l	12–18			*	0	•••	••	••	••••	•	•••	••	•••	•••	•	••	•	•••	•••									••	4
Cato + Trend	250 Rimsulfuron	2	50 g 0,3 l	12–16	45		*	0	••	•	•	••	••	•		•					•••			••	••		••	•••	••••	••	•••	3
Daneva	100 Mesotrione	27	1 l 2 x 0,75 l	12–18	14	5	*	5	•••	••	••••	••	•	•••	•	••	•••	••••	••		••		••			•	•	••			•••	2
Delion	480 Dicamba	4	0,6 l	13–18	n. i. Pack		*		••		•		•	••	••	••	•••	•		•	•••	•••									••	4
Dicash	480 Dicamba	4	0,6 l	13–15			*		••		•		•	••	••	••	•••	•		•	•••	•••									••	4
Diniro/Spandis[5] + Adigor	100 Nicosulfuron 40 Prosulfuron 400 Dicamba	2 4	0,4 kg 1,2 l	12–18	51		*	5	•••	•••	•••	•••	••	•••	••	•••	•••	•	••		•••	•••		••	••	•	••	••	•••	••	••	4
Effigo	267 Clopyralid 67 Picloram	4	0,35 l	NA			*	0			••	••	••	•	•	••		••													••••	3
Elumis[5]	75 Mesotrione 30 Nicosulfuron	27 2	1,5 l	12–18		20	*	0	•••	•••	••••	•••	•••	•••	••	••	•••	••••	••	••	•••		•	••	•••	•	••	•••	••••	••	•••	2
Flurostar 200	200 Fluroxypyr	4	1 l	13–16			5*	5			••		•••	••	•	•••		••			•••	••									••	1
Focus Aktiv[7]	100 Cycloxidim	1	2 l + 1 l	NA	65		*	0																••••	•••	•••	•••	•••		••	••••	2

*1) Mindestbreite eines dicht bewachsenen Randstreifens zum Gewässer bei Pflugsaat in m; 2) bei 90 % –abdriftmindernden Düsen in m; 3) maximal einmal in drei Jahren je Fläche; 4) nicht in Wasser-/Heilquellenschutzgebieten; 5) maximal einmal in zwei Jahren je Fläche; 6) nicht auf drainierten Flächen; 7) Nur in Cycloxidim-resistenten Sorten (Duo Sorten)! Fuchsschwanz: 2 l/ha, Quecke 4 l/ha; * = länderspezifischer Mindestabstand zum Gewässer;*

•••• = sehr gute Wirkung/Verträglichkeit, ••• = gute Wirkung/Verträglichkeit,
•• = mittlere Wirkung/Verträglichkeit, • = Teilwirkung/weniger verträglich

top agrar; Quelle: LWK NRW